

# Canna F1 – Série South Pacific

**Couleurs disponibles :** Ivoire, Orange (lauréat AAS), Rose, Écarlate (lauréat AAS)

**Hauteur au jardin :** 66 à 81 cm (26 à 32 pouces)

**Caractéristique de nouveauté :** Variété vigoureuse, compacte, issue de semis, non sujette aux maladies transmises par la production de rhizomes ; neutre à la photopériode ; bien ramifiée ; excellente floraison répétée sur plusieurs hampes. Première Canna F1 issue de semis. Takii a testé et confirmé qu'aucune bactérie nocive n'est présente sur ou dans nos graines de Canna. Pour éliminer tout risque, chaque lot de graines est nettoyé avant scarification.

**Utilisation :** Idéal pour bordures de jardin, contenants mixtes, pots, zones peu profondes des jardins aquatiques.

---

## Recommandations culturelles

### Phase de plug :

- **Période :** Décembre à mai
  - **Germination :** 24–27 °C (75–80 °F) ; semer profondément (2 à 3 fois le diamètre de la graine), presser légèrement le sol pour recouvrir la graine ; un surfaçage avec le substrat est recommandé. Germination en 7–10 jours.
  - **Chambre de germination (méthode préférée) :** Maintenir humidité élevée et température constante (25,5–26,6 °C). Retirer après 4–5 jours ou dès la levée.
  - **Sans chambre :** Couvrir les plateaux avec plastique pour conserver humidité et chaleur. Retirer après 4–5 jours.
  - **EC (méthode “pour thru”) :**
    - Levée → cotylédons : 1,0 mS/cm
    - Cotylédons → vraie feuille : 1,5 mS/cm
    - Fin de plug : 0,75–1,0 mS/cm
  - **Durée plug :** 4–6 semaines
- 

### Finition

- Éviter l'arrosage par aspersion (risque accru de maladies bactériennes).
- Transplantation : positionner le plant de manière à ce que le niveau final du sol corresponde à la base des premières feuilles.
- Tailler les hampes florales fanées pour stimuler de nouvelles floraisons.
- **Taille de pot :** Quart ou plus

- **Durée** : 80–110 jours après semis (selon température)
  - **Température** : Jour 20–22 °C ; Nuit 15,5–17,7 °C
  - **EC** : 1,5–2,6 ; **pH** : 5,8–6,2
- 

### Maladies et traitements

- **Bactéries** : Fréquentes sur Canna ; programme de pulvérisation régulier recommandé. Sprays à base de cuivre (ex. ManKocide) utiles.
- **Pythium** : Subdue Maxx, Banrot 40WP, Heritage, Aliette efficaces.
- **Rhizoctonia** : Banrot 40WP, fludioxinil (Medallion 50WP), Terraguard efficaces.  
**Important** : Toujours lire et respecter les étiquettes des pesticides.

