

Bien fournie, cette plante au feuillage argenté est idéale dans les compositions florales.

- Facile à cultiver, plants bien ramifiés sans pinçage.
- Feuillage et tiges de couleur argentée.
- Feuilles de 0,6 cm, forme ronde à ovale.
- Hauteur au jardin : 15 à 20 cm
- Envergure : 40 à 60 cm
- 90% de plants transplantables
- Semences à enrobage multiple (3).

Production en micro motte :

Substrat : Utiliser un médium qui se draine bien et qui est exempt de maladies, avec un pH de 5,5 à 6,3 et des éléments nutritifs de base.

Semis : Enrobage de 3 semences par unité. Ne pas recouvrir les enrobages de terre au moment du semis.

Température :

Germination : 22 à 24° C

Stade des cotylédons : 18 à 22° C

Vraies feuilles : 18 à 21° C

En plateau de micro mottes : 16 à 18° C

Luminosité :

Semis : non nécessaire

Après la germination : 1 000 à 2 500 pi. chandelles (10 000 à 30 000 Lux)

Jusqu'à maturité : jusqu'à 5 000 pi. chandelles (54 000 Lux) si la température peut être contrôlée.

Humidité : Maintenir l'humidité relative à 95% jusqu'à la présence de cotylédons.

Humidité du sol : Garder le sol très humide jusqu'à ce que les radicelles se développent. Réduire alors le taux d'humidité. S'assurer d'autre part que les semences ne sèchent pas.

Fertilisation : À l'apparition des radicelles, appliquer 50 à 75 ppm N (15-0-15). Lorsque les cotylédons sont présents augmenter la dose à 100-150 ppm N.

Régulateur de croissance : Non nécessaire.

Étapes suivantes :

Sol : Utiliser un sol bien drainé, exempt de maladies, avec un pH de 5,5 à 6,5.

Température : Nuit : 16 à 18° C
Jour : 18 à 24° C

Luminosité : S'assurer d'un éclairage de densité moyenne à élevée. Le feuillage des plants sera plus argenté si l'éclairage est plus élevé. Sous une lumière faible le feuillage semble plus vert.

Irrigation : Laisser sécher les plants entre les arrosages. Éviter les arrosages en fin de journée. Le Botrytis pourrait alors se manifester.

Pincement : Non nécessaire

Calendrier de culture :

Du semis à la transplantation : 6 à 7 semaines

Transplantation à la vente : 8 à 9 semaines

Dimension du pot	Nombre de plants	Transplantation à la vente
10 cm	1	8-9 sem.
20 cm	3	9-10 sem.

En produisant cette plante directement dans les plateaux de 75 unités, la culture peut se faire en 9 à 10 semaines, réduisant le temps de production de 2 à 3 semaines.

Problèmes communs :

Insectes : Rien de sérieux à signaler

Maladies : Botrytis (si trop d'humidité)