

Lavande Hidcote

Guide de Culture

Usages: Bordure, feuillage ornemental, plante aromatique, plante médicinale, pot et contenants, plante pollinisatrice attirante pour les abeilles, toits fleuris.

Exposition: Soleil

Hauteur au jardin : 30 cm (12")

Temps de culture: 10-12 mois

Temps de semis: Janvier-Mars pour ventes en pots sans fleurs en mai, Juin-Août pour vendre fleuri l'année suivante.

Méthode de semis: 1-2 semences par cellule

Germination: Germe en 14-20 jours à 18-22 °C (65-72 °F). La lumière est requise pour la germination. Les semences traitées Apex telle que vendues, augmentent le pourcentage de germination comparativement aux semences nues.

Culture: Transplantez la micromotte après 9 semaines. Cultivez à 12-18°C (55-65°F) dans un milieu de culture plutôt alcalin. La vernalisation est nécessaire pour initier la floraison. Après la période de vernalisation, augmentez la température à 15-18°C (60-65°F) pour 6-7 semaines sous des conditions de jours longs afin d'initier la floraison.

Milieu de culture: Utilisez un substrat qui se draine bien avec 0-15 % d'argile, 0-15 %de perlite, sable ou écorce, 1-2 kg/m³ d'un engrais complet bien balancé, 0-2 kg/m³ d'engrais à libération lente (3-9 mois), fer chelaté, microéléments, pH: 5.8-7.0.

Temperature: Cultivez à 12-21 °C ou à l'extérieur. En forçant les plants au printemps à température chaude et à haute intensité lumineuse, on réduit le temps de culture.

Fertilisation:

Fertiliser modérément

info@benary.com | www.benary.com

Ref: June 13, 2014

<http://www.benary.com/en/product/O9970?pdf=704>

